

日(曜)	時刻	水位	流速	流量	雨量	気温	水温	PH	電導率	その他(生物、透視度等)				
										cm	目視	m3/分	mm	°C
1	土	18:45	17.1				28.9	29.4	6.9	210	1		5	
2	日	18:30	17.0				28.6	29.4	6.7	200	1		3	シマドジョウ1
3	月	18:30	16.6				28.5	29.1	7.2	200			3	
4	火	18:40	16.8				33.2	30.2	7.1	200				—
5	水	18:10	16.2				29.2	29.7	7.3	230			6	ハグロトンボ1
6	木	18:35	15.9				29.3	30.1	7.3	230		1	5	
7	金	18:30	15.1				30.0	29.8	7.3	220			7	
8	土	18:45	14.8				27.9	28.7	7.3	220			12	
9	日	18:50	14.6				27.2	28.6	7.3	240			7	
10	月	18:20	23.8			36	25.9	26.1	7.2	78	1	2	5	ヨシノボリ1 タモロコ1 アオサギ樹上 雨44c
11	火													(旅行)
12	水													(旅行)
13	木				10									(旅行) 雨10c
14	金	18:30	14.5		0	27.8	28.3	7.4	220	3		1		
15	土	18:50	13.7		1	27.0	28.8	7.3	210	1		2	タモロコ1	カワセミ1
16	日	18:45	13.5				26.9	28.4	7.2	240		1	3	
17	月	18:50			52	25.9								— 雨72c
18	火	15:10	17.0		2	31.3	27.2	7.5	200			9	スジエビ1	雨 2c
19	水	16:50	16.0				29.3	27.3	7.1	220			2	オオブタクサ刈り
20	木	18:15	15.7		6	25.6	26.2	7.2	200	1		7	オオブタクサ刈り トウキョウダルマガエル	雨5c
21	金	16:20	16.1		0	28.9	26.8	7.1	220				—	オオブタクサ刈り クマゼミ鳴く
22	土	17:10	15.0				29.9	29.6	7.3	250	2		3	スジエビ1 ツクツクホーシ鳴く
23	日	17:35	14.5		0	26.6	28.6	7.2	240				5	オオブタクサ刈り
24	月	18:25	17.0				23.6	26.3	7.6	220			3	スジエビ3 オオブタクサ刈り
25	火	17:25	18.0		0	21.3	23.4	7.4	250		1	3	タモロコ1	オオブタクサ刈り
26	水	17:20	17.4		40	21.4	22.2	7.4	109	5		5	ヨシノボリ1	雨39c
27	木	18:00	15.5		0	25.0	24.9	7.4	220	1		5		オオブタクサ刈り
28	金	18:30	15.0		0	22.2	23.5	7.4	230				3	オオブタクサ刈り
29	土	18:00	14.8		1	22.1	23.0	7.4	210		1	6		オオブタクサ刈り
30	日	21:00			6	22.2								(外出)
31	月	18:30	15.2		7	23.1	23.2	7.4	122				8	オオブタクサ刈り
計			16.0			161	26.7	27.3	7.3	207	16	6	118	シマドジョウ1 ヨシノボリ2 タモロコ3 スジエビ5

特記

降水量が少なく、平均水位も低い。そのため良流は1日もなかったが、「断流」は小刻みな降雨によって免れた。  
 トウキョウダルマガエルが初めて観察された。水際の草を刈らずに残すようにしてきた成果だろうか。両岸に花粉症を引き起こすオオブタクサが茂り、種を結ぼうとしていた。結実の前に退治すべく、10日ほどかけて99%は刈り取ることができた。