

雨水・和泉川水測定 2016年 3月

東山の水辺

日(曜)	時刻	水位 cm	流速 目視	流量 m3/分	雨量 mm	気温 ℃	水温 ℃	ph	電導率 マイクロS	その他(生物、透視度等)					
										ア	オ	ザ	ス		
1	火	17:20	18.5	良流		2	6.8	11.9	7.4	200	2	2	3	1	モツゴ1 カワセミ1 メジロ2
2	水	17:30	18.1	良流			9.4	12.1	7.3	200	1	1	3		カワセミ1 カルガモ2
3	木	18:20	17.7				9.1	13.4	7.3	200				×	コサギ1 キジバト1
4	金	17:30	17.6				13.2	14.3	7.4	200	1		1	1	コサギ1
5	土	17:50	17.5				14.1	14.9	7.5	200	1	2	1	2	啓蟄 アオサギ1 コサギ1
6	日	17:50	17.4			0	15.5	14.8	7.5	200	4	2	1	1	ヒヨドリ1 シジュウカラ1
7	月	17:20	22.5	濁流		46	15.3	15.0	6.9	65					— 雨64c
8	火	17:55	18.6	良流			15.9	18.4	7.0	200			5	2	コジュケイ2 コサギ1 ムクドリ6 アオジ2 キジバト2
9	水	17:20				45	7.4								— コサギ1 ツグミ1 アオジ1 雨63c
10	木	17:45	20.8	良流			7.9	11.1	7.3	200	2		7	2	メジ2 シジュ2 アオジ2 ハクセキ1
11	金	17:50	20.3	良流		4	5.3	10.4	7.1	196					— コゲラ1 コサギ1 ハシブ1 シジュ2 ツグミ1
12	土	17:55	20.2	良流			7.4	11.3	7.2	210	1		3	2	アオジ1 ツグミ1 シジュ2
13	日	17:45	19.6	良流			8.9	12.7	7.2	200			3	4	シジュ2
14	月	17:40				52	4.2								— 雨76c アオジ2 シジュ4
15	火	17:30	22.2	青白濁			10.1	14.3	7	200			4	3	コサギ1 カルガモ1 シジュ1 ヒヨ1 ボソ1
16	水	17:45	21.6	良流			12.0	13.7	7.2	200	2		2	4	ジョウビタキ1 ハクセキレイ1 ムクドリ1
17	木	17:50	21.3	良流			16.8	17.8	7.2	210			2	3	カワウ1 ジョウビタキ1 アオジ1 コサギ1
18	金	17:35	20.8	良流			16.7	16.3	7.2	210			2	5	シマドジョウ1 カルガモ2 コサギ1
19	土	17:35	22.7	濁流		26	16.3	15.6	7.1	118					— 雨35c カルガモ2 シジュ2
20	日	17:55	20.6	良流		3	12.1	15.3	7.2	200	3		9	8	雨3c コサギ1 カルガ1 シジュ2
21	月	18:00	20.5	良流			9.4	13.6	7.3	210	4		5	3	シジュ2
22	火	18:05	20.2	良流			13.5	16.2	7.3	200			2	3	シジュ2
23	水	17:55	19.6	良流			13.0	17.1	7.5	200		1	4	1	
24	木	17:45	19.5	良流		0	7.3	11.2	7.6	200	2		2	2	コサギ1 ツグミ1 コゲラ1 シジュ1
25	金	17:40	19.2	良流			10.5	13.8	7.4	200	1			2	カルガモ2
26	土	18:05	19.4	良流			10.2	14.4	7.9	200					× 悪戯 コサギ1 アオサギ1 シジュ2
27	日	17:55	19.0	良流			13.3	16.5	7.3	200	1		1	4	クロメダカ1 カルガモ1 シジュ1
28	月	18:00	18.6	良流			11.1	14.8	7.8	200	1		3		ハクセキレイ1 カワウ1
29	火										4		3	2	カルガモ2
30	水	15:55	18.1	良流			19.6	16.1	7.5	200	16		2	1	キジバト1 シジュ2
31	木	18:05	17.7				15.8	17.1	7.7	210			2	3	シマドジョウ1 コサギ1 アオサギ1
計			19.6	良20		178	11.6	14.4	7.3	194	46	8	70	59	モツゴ1 シマドジョウ2 クロメダカ1

特記

降水総量も降水の間隔もよく安定した水位が保たれ、良流が20と多かった。急激な寒暖を繰り返しながら、春に向かって急激に気温が上昇してきた。オイカワに比べアブラハヤの出現が多かった。水辺には冬鳥をはじめ多くの野鳥が観察された。川の水と森が草で結ばれているこの環境が野鳥たちにも生きやすいのであろう。