

日(曜)	時刻	水位 cm	流速 目視	流量 m3/分	雨量 mm	気温 ℃	水温 ℃	ph	電導率 マイクロ	その他(生物、透視度等)					
										ア	オ	ザ	ス		
1	木	17:30	23.1	濁流		85	17.0	13.5	7.0	139	1		1	カルガモ2	
2	金	17:30	20.1	良流			10.3	14.0	7.1	200	1		2	5	
3	土	17:55	19.6	良流			10.6	13.5	7.1	200	1		1	12	サホコカゲロウ1 アズマヒキガエル1
4	日	17:55	19.4	良流			16.3	16.5	7.3	210	1		4	3	
5	月					25									— 雨52c
6	火	17:40	20.7	薄泥流			6.4	9.9	7.4	200					— 沈下橋工事開始 ツグミ1
7	水	17:30				31	8.1								— 雨34c
8	木	17:30	31.2			96	11.4	12.4	7.3	200					— 雨194c ツグミ1
9	金					5									— 雨5c
10	土	17:35	28.7	良流			9.0	12.8	7.0	210			8	1	カルガモ2
11	日	17:50	27.4	良流			11.5	14.0	7.3	200	2		4	1	カルガモ2
12	月	17:25	24.1	良流			11.4	14.9	7.5	200			1	4	タモロコ1 カワカゲロウ1 ミズムシ1
13	火	17:30	22.9	良流			15.3	15.5	7.5	200					—
14	水	17:40	22.3	薄白濁			17.7	17.6	7.3	200	2		3	6	タモロコ大1 カルガモ2
15	木	17:05	22.0	薄白濁			17.9	16.3	7.5	200	1		2	13	
16	金	17:40	21.3	良流		0	11.1	14.2	7.5	197	2		2	10	ヨコエビ1 カルガモ2
17	土	18:05	21.0	良流		4	8.6	—	7.3	210	1		2	9	雨5c カルガモ2
18	日	17:40	20.7	良流			15.2	15.4	7.3	191			1	7	カルガモ2
19	月	18:10	20.4	良流			14.9	13.9	7.1	200			1	5	
20	火	17:20				16	8.0								—
21	水	17:25				29	2.7								— 春分の日 雨29c 雪 霰 雨
22	木	17:45	23.9	良流			11.2	12.6	7.6	200	1		3	7	カルガモ2
23	金	17:30	22.1	良流			13.4	14.8	7.8	200				11	サホコカゲロウ1 カワカゲロウ1
24	土	17:50	21.7	良流			12.8	14.9	7.4	200			1	6	サホコカゲロウ1 カワカゲロウ2
25	日	17:45	21.5	良流			13.7	17.0	7.4	200	1			3	ヨコエビ1 カルガモ2
26	月	18:25	21.1	良流			15.9	17.0	7.4	—					— カルガモ2
27	火	16:30	20.8	良流			17.5	18.0	7.1	200	1		6	26	カワカゲロウ1
28	水	17:20	20.6	良流			18.2	19.4	7.2	194			6	10	カワカゲロウ1
29	木	17:40	20.3	良流			19.3	20.1	—	200			3	20	カワカゲロウ2 ヨコエビ1 カル2
30	金	17:35	19.9	良流			13.4	17.6	—	194			3	20	タモロコ1 カワカゲロウ1ドブネズミ1
31	土	16:55	19.5	良流			15.8	17.7	7.7	195			3	23	ヨコエビ1 カルガモ2
計			22.2	良21		291	12.9	15.3	7.3	198	15	0	56	203	タモロコ1 ヨコエビ4 ミズムシ1 カワカゲロウ9 サホコカゲロウ3

特記

適度な降水があり、良流が21日と安定したきれいな水位曲線が描けた。アブラハヤが少しづつ戻ってきている。カゲロウ類の幼虫やヨコエビが今までになく多くなった。スジエビと共に水生生物の食物連鎖の底辺を担うものであることから、これからどんな魚類が棲息するようになるか楽しみである。そのためにも深みや藻類が欲しい。